

---

## CAPITULO III

### DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA

1.- Riesgo de alteración de la nutrición por defecto.

R/C incapacidad económica para adquirir cantidad de alimentos de alto contenido proteínicos, tanto minerales como animales, y falta de información acerca de productos similares y de bajo costo.

2.- Alteración del patrón de sueño.

R/C alteraciones extremas ambientales; ruidos nocturnos y gente extraña a su alrededor.

M/P periodos de insomnio ocasionales, ojeras, bostezos diurnos y dos horas aumentadas de siesta.

3.- Riesgo de infección.

R/C pérdida de la continuidad de la piel por quemaduras de primer y segundo grado en región total de cara, ambos pabellones auriculares y cara dorsal de ambas manos, 12% de la superficie corporal total.

4.- Deterioro de la integridad cutánea.

R/C exposición a factores físicos externos (quemaduras por fuego).

---

M/P lesiones dermoepidérmicas en región total de cara dorsal de ambas manos; cara, predominando en hemicara izquierda y superficie total de ambos pabellones auriculares, con prurito constante.

5.- Deterioro de la movilidad articular de ambas manos.

R/C presencia de férulas de protección y vendaje necesario de 10 días de evolución,

M/P disminución de la fuerza en el movimiento de prensión y arcos de movimiento menor a 45°, expresión verbal de incomodidad.

6.- Déficit de autocuidado baño y arreglo (nivel 2).

R/C limitación de movimientos en articulación elipsoidal de muñeca.

M/P expresión verbal de incapacidad para utilizar sus manos y facies de incomodidad al arreglarse.

7.- Déficit de autocuidado en el uso del sanitario.

R/C limitación del movimiento articular de manos para manejar sus ropas personales.

M/P expresión verbal y facial de "enojo" por no poder entrar solo al baño.

8.- Riesgo de síndrome de desuso.

R/C inmovilización con férulas necesarias y dolor ocasional a la utilización de ambas manos (nivel de tolerancia 3 en escala de 0 a 10).