
CONCLUSIONES

Al término de nuestro trabajo pudimos percatarnos del grado de reincidencia hospitalaria que existe en el Hospital General del Estado, esto originado por la falta de autocuidado de la enfermedad repercutiendo en el organismo del paciente. Todo esto es por causa de pertenecer a un nivel socioeconómico medio-bajo, desligándose con ello la propia ignorancia que tienen acerca de la falta de información que existe.

Se considera conveniente concluir que existen tratamientos a corto y a largo plazo es decir, de 6 meses hasta un año, pero que la gran mayoría del ser humano lo abandona antes de terminarlo, éstos pueden producir resistencia y al reiniciar el esquema, el medicamento ya no funciona aunque se lo tome completo.

Iniciando el tratamiento en el lapso de 15 días hay más probabilidad que una persona se pueda contagiar con Tuberculosis Pulmonar, porque tienen defensas muy bajas en el organismo que predispone a más infecciones y al deterioro del mismo. Además que se destruye el tejido pulmonar con aparición de insuficiencia respiratoria.

Para llevar un control médico se realizan estudios de 3 a 4 semanas para comprobar los resultados obtenidos y llegar a la conclusión de no contagiar más a la sociedad.

SUGERENCIAS

Que con la colaboración del Hospital General del Estado se sigan diseñando más programas con la finalidad de orientar, informar y prevenir complicaciones, esto por medio de personal médico, enfermería y trabajo social. Posteriormente difundirlo a través de los medios de comunicación, informando así a la población en general acerca de la magnitud del problema y de sus posibles consecuencias, es decir, complicaciones, además de hacer énfasis acerca de la gran importancia que tiene el control médico así como el no llevar el tratamiento adecuado o bien no respetar indicaciones médicas (abandonando el tratamiento de largo plazo).