ÍNDICE DE TABLAS.

Página.

Tabla I. Claves asignadas a las muestras, tomando en cuenta las de 1999 que corresponden a las tres regiones geográficas en las que fueron colectadas las del 2000. *Primeros dos dígitos:* año de colecta; *primeras tres letras:* estado de colecta; *cuarta letra:* región del estado de colecta (únicamente Sinaloa); *tercer dígito:* número de granja por región; y separado por un guión el *cuarto dígito:* el número de muestra por granja. 11

Tabla II. Características de los controles positivo (+) y negativo (-) empleados en la detección de los virus del síndrome de la mancha blanca (WSSV), de la necrosis infecciosa hipodérmica y hematopoiética (IHHNV), del síndrome de Taura (TSV), y del síndrome de la cabeza amarilla (YHV). 12

Tabla III. Resultados de las pruebas de detección de los virus WSSV, IHHNV, TSV y YHV en 17 muestras de camarón colectadas en el norte e Nayarit y en las zonas sur y centro del estado de Sinaloa . WSSV: los datos se refieren a PCR tradicional y con el DAV (en paréntesis). IHHNV: pruebas DAV. TSV y YHV: pruebas de RT-PCR e hibridación *dot-blot* (en paréntesis). +: presencia detectada; –: presencia no detectada. Se presentan también las prevalencias parciales y globales para cada virus. 22

Tabla IV. Características de las muestras. Origen de la poslarva: L (laboratorio) y S (silvestre); especie: 01 (*L. vannamei*) y 02 (*L.stylirostris*) y sistema de cultivo: 01 (extensivo), 02 (semiintensivo) y 03 (intensivo). 27