

con la posterior para formar el paladar hacia las doce se--  
manas.

Si aparece una fisura, es el resultado de que las dos mita--  
des no han crecido juntas o de que ha sufrido en algún si--  
tio una imperfecta unión y la subsecuente separación.

#### VIII.- GENERALIDADES DEL PALADAR HENDIDO.

##### a).- ETIOLOGIA.

Aunque en el hombre se desconoce, parece ser que la heren--  
cia desempeña un papel muy importante. Sin embargo, el tipo  
más frecuente de fisuras en el hombre es la fisura unilate--  
ral izquierda del paladar y prepaladar, se ve sobre todo en  
los varones con una frecuencia relativamente alta mientras  
que el tipo que la sigue en frecuencia ( fisura exclusiva--  
mente del paladar ) se ve, sobre todo en mujeres, en casi -  
total en ausencia de antecedentes hereditarios. Ello sugie--  
re causas completamente distintas.

Algunos investigadores afirman que en las series que se -  
han estudiado, existe un significativo aumento estadísti--  
co en la frecuencia de dichos parientes, siendo el mismo -  
aumento en el resto de la población.

b).- FRECUENCIA.

Algunos investigadores dicen que la frecuencia entre la población en general es considerada por uno entre trescientos setenta y cinco, y otros uno entre setecientos setenta y dos nacidos vivos, datos que se han obtenido de los certificados de nacimiento. Se dice que si uno de los padres presenta fisura del paladar hay un 2% de probabilidades de que un hijo también lo padezca, este porcentaje aumenta hasta 14% si existe un antepasado con alguna fisura del paladar. Si unos padres tienen un hijo con fisura de paladar, se cree que hay un 4.5% de probabilidades de que los futuros hijos presenten la misma deformación.

El uso de la vitamina B-6 y el ácido fólico, más una cápsula de multivitaminas, se ha recomendado durante los primeros meses de embarazo en mujeres que anteriormente tuvieron un niño con fisura de paladar, de labio o ambos. Ciertos informes muestran una disminución en la frecuencia de estas malformaciones si se sigue el método descrito; a pesar de ello no se ha generalizado su uso.

c).- PRONOSTICO.

Es bueno, pero depende de la extensión del defecto al nacimiento. La dislalia puede persistir después de la operación