

Estado económico.— Las condiciones económicas probablemente influyan desde el punto de vista de que, cuando son malas son más frecuentes los trabajos exhaustivos.

Nutrición materna.—La mayoría de los autores coinciden, que la nutrición materna, principalmente en lo que se refiere al aporte proteico guarda relación directa con el desarrollo fetal, trayendo como consecuencia, cuando dicho aporte es insuficiente la disminución franca en el peso y la talla del producto, como también probablemente influya desfavorablemente en las condiciones fisiológicas.

CAUSAS DE PREMATUREZ

Sólo existe razón fisiológica ostensible en casi el 50% de partos prematuros, sin embargo al respecto no existe igualdad de criterios la división más lógica y aceptable que se ha conocido es la de:

- 1) Partos prematuros por causa desconocida
- 2) Partos prematuros por causa conocida.

Lamentablemente casi la totalidad de partos prematuros se encuentran dentro de la primera clasificación y pocas son las causas conocidas causantes del parto prematuro. Algunas de las causas conocidas o probables no tienen una explicación patogénica correcta o suficiente, pero con frecuencia se le ve unida al parto antes de término, razón por la cual se les considera como tales.

Entre las causas conocidas o probables consideramos las siguientes:

	Toxemia del embarazo	
Obstétricas	Placenta previa	
	Productos múltiples	
Maternas	Hemorragias uterinas	
	Primiparidez	
	Matriz Infantil	
	Enfermedades agudas	Tifo-partíficas
	Neoformaciones uterinas	
		Por virus
		Sífilis
		T.B.P.
Generales		Ca. avanzado
		Ca. avanzado
		Diabetes Mellitus
		Hipertiroidismo
		Físicos
		Físicos
		Psíquicos
	Traumatismos	
	Trabajo excesivo	
	Coito	
Miscelaneas		
Fetales	Algunas malformaciones congénitas	

Obstétricas.—De las causas conocidas, son las más frecuentes; algunas de ellas provocan escasa viabilidad del producto y por lo tanto gran mortalidad del mismo.

Generales.—Las enfermedades agudas además de poder traer como consecuencia malformaciones o muerte fatal, también puede ocasionar expulsión prematura, la infección aguda principalmente viral actúa a través de la hiperpirexia materna, que produce lesiones placentarias o malformaciones congénitas del feto.

Las infecciones como por ejemplo en la sífilis, o bien a través de una gran desnutrición materna como sucede en la tuberculosis.