

**CONCLUSIONES.-**

- En cualquier etapa del Síndrome de Landry-Guillain-Barré-Strohl, como en cualquier otra enfermedad, es posible hacer prevención y la enfermera está en posibilidad de aplicarla.  
**PREVENCIÓN PRIMARIA:** Evitar que el agente casual de la enfermedad se ponga en contacto con el organismo humano.  
**PREVENCIÓN SECUNDARIA:** Si ya existe invasión, impedir que avance  
**PREVENCIÓN TERCIARIA:** Impedir que se presenten complicaciones y, llegada la enfermedad hasta la incapacidad física, evitar que el individuo se convierta en un ser improductivo; hacer que la sociedad, y él mismo, acepte sus limitaciones, y reintegrarlo a su núcleo socioeconómico con un máximo de funcionalidad.
- Para evitar, o al menos, disminuir esa angustia y temor a lo desconocido, que desde siempre acompaña al Hombre, se debe explicar al paciente y a su familia en qué consiste la enfermedad y qué se puede esperar de ella. Para lograr un máximo de cooperación de parte del paciente se le debe explicar para qué y por qué se realizan los procedimientos, y qué se espera que él haga.
- Cuando se emplee terapéutica con corticosteroides la enfermera debe estar mucho más al tanto de las necesidades del paciente, para descubrir en forma temprana efectos secundarios indeseables.- Además debe explicar al paciente con anticipación.
- El personal de Enfermería debe conocer profundamente lo relacionado con examen neurológico, punción lumbar, exámenes de laboratorio, insuficiencia respiratoria, manejo de respiradores a presión, traqueostomía y reeducación muscular para dar una buena atención a este tipo de pacientes.

- *En este caso se hace patente, una vez más, la necesidad de una coordinada y, por tanto, efectiva participación de todos los miembros del equipo de salud.*

*Recordemos ese hermoso, cuanto verdadero, pensamiento de León-Felipe:*

*" VOY CON LAS ALAS TENSAS  
Y REFRENANDO EL VUELO,  
PUES NO ES LO IMPORTANTE  
LLEGAR SOLO NI PRONTO,  
SINO CON TODOS Y A TIEMPO."*