

VI.- PRONOSTICO.-

La mortalidad es de menos del 1% en niños, pero la gravedad de esta enfermedad que no sigue el curso típico benigno es muy impresionante, se ven casos de hepatitis fulminante, hepatitis activa crónica, todas las cuales comenzaron en forma de hepatitis benigna.

VII.- ASISTENCIA DE ENFERMERIA.-

En los últimos tiempos ha sido la hepatitis en cualquiera de sus formas un grave problema de las Instituciones Hospitalarias, ya que se considera una enfermedad altamente transmisible y es por ello que la enfermera debe llevar cuidadosamente el plan asistencial a pacientes con este tipo de padecimientos.

La labor de la enfermera en la prevención, rehabilitación y curación de los pacientes con hepatitis, tanto a nivel hospitalario como en la comunidad, es tarea continúa, pero bien desarrollada y con objetivos precisos, se obtendrán resultados positivos en el control de la enfermedad.

CUIDADOS DE ENFERMERIA EN LA ADMICION DEL PACIENTE A LA UNIDAD DE PEDIATRIA.

El Servicio de urgencias pediátricas recibe con frecuencia pacientes con distintos padecimientos, con los cuales se practica continuamente las técnicas de asepsia. Sin embargo, a la menor sospecha de que dichos padecimientos son infectocontagiosos como la Hepatitis, la enfermera observará que las técnicas de asepsia realizadas para la atención del paciente sean estrictamente las medidas para restringir al máximo la propagación de ésta enfermedad.

El niño será sometido a estudios de laboratorio y exploración física, las cuales proporcionarán datos que dictarán el diagnóstico probable o preciso, es muy importante para la obtención del diagnóstico la elaboración de la historia clínica pues con frecuencia se obtienen datos de suma importancia para la elaboración del diagnóstico.

Una vez establecido el diagnóstico, se manejará al paciente con técnica de barrera ya que con anterioridad se ha dicho que este padecimiento es transmisible, por lo tanto es necesario aislar al paciente con el fin de llevar técnicas estrictas de asepsia, hay mayor seguridad de protección para el resto de los pacientes y se evitarán las infecciones cruzadas.

AISLAMIENTO.-

Significa para el niño separación física de sus -

padres y demás familiares, así como del resto de los pacientes, la incomunicación en que se vé sometido el niño, puede alterarlo en el aspecto psicológico; aquí la enfermera deberá explicar a los padres y al niño el motivo de su aislamiento, con el fin de proporcionarles seguridad y apoyo.

Cuando el niño se encuentra en condiciones de tener interacción social y actividad de juegos apropiados a su edad, la enfermera debe darle oportunidad a que tenga esta distracción tomando en cuenta que los materiales de juego se pueden limpiar, lavar y esterilizar o desechar cuando se retire al niño de su aislamiento.

EL USO DE LA BATA.-

En la actualidad, algunas Instituciones todavía se usa en todas las enfermedades infecciosas, como la hepatitis viral, ya que se debe tomar en cuenta las vías de transmisión; no es necesario utilizar la bata para el manejo de estos pacientes, lo mejor que podría hacer la enfermera es llevar técnicas de asepsia en el lavado de manos, en la eliminación de heces y sangre contaminada por el virus, ya que las vías de entrada del virus al organismo son oral o parenteral, por transfusiones de sangre y sus derivados.

COLABORACION DE LA ENFERMERA A NIVEL HOSPITALARIO EN LA
HEPATITIS PRODUCIDA POR EL VIRUS B.-

FORMAS DE CONTRAER EL PADECIMIENTO.-

- I.- Todo candidato a donador, debe ser examinado e interrogado antes de donar la sangre para proteger a él y a quién la recibe.
- II.- Establezcase una estricta disciplina en los bancos de sangre rechazando como donadores a todos los individuos que tengan antecedentes de hepatitis vi-
ral que presentan evidencia de uso de drogas o que hayan recibido una transfusión de sangre durante -
los últimos 6 meses.
- III.- Mantener bajo vigilancia a todos los casos de hepa-
titis transfuncional, incluyendo un registro de to
das las personas que donaron sangre por cada caso.
- IV.- Esterilícense cuidadosamente las jeringas, agujas y
estiletes para punción digital; es preciso utilizar
jeringas y agujas recién esterilizadas para cada -
personas sometida a pruebas cutáneas u otras inocu-
laciones parenterales o punción venosa; siempre -
que sea posible debe usarse equipo desechable.