

ocurrir una falla mecánica o eléctrica.

Si hay adhesión firme en la cervix y se aplica succión prolongada, puede ocurrir pérdida excesiva de sangre. .

COMENTARIO:

En éstas técnicas usadas de abortos terapéuticos; la enfermera debe estar consciente que debe cooperar en una forma positiva y profesional. La paciente que está en la mesa de operaciones (durante la operación del legrado, aborto por aspiración o amniocentesis) se encuentra en tensión, tanto física como emocional; y la enfermera debe ser comprensiva con ella y al mismo tiempo que colabora con el médico, durante éste trance. debe mostrar a la paciente una actitud amigable y lograr que ésta le deposite su confianza, y puede lograrlo simplemente con algún gesto; o actitud: limpiarle el sudor de la frente, darle una palmadita en el hombro, así, la paciente interpretará su acción con un "No se preocupe, todo saldrá bien... no está sola".

Una vez ya efectuada la técnica de aborto terapéutico elegida, la enfermera se encargará de trasladarla a su unidad (ya antes asignada y preparada) y cuidará de ella brindándole los cuidados de enfermería requeridos en éste caso, ya sea, vigilancia de la venoclisis, aseo vulvar, cambio de apósitos, administración de medicamentos indicados exhortando a las enfermeras de los turnos siguientes, continúen con la vigilancia, y cada una de ellas anote en la hoja de la enfermera sus observaciones, ya que ésta es de suma importancia para el cuerpo médico, puesto que se dará una idea más clara de la evolución de la paciente.

TECNICAS DE ABORTO SEPTICO

Los accidentes más graves por infección, se encuentran en los casos de aborto séptico (criminal). El uso de instrumentos rudimentarios no apropiados para el caso, y en condiciones de limpieza que dejan mucho que desear, es razón suficiente para que una persona sufra una infección y se perfora el útero, al carecer de conocimientos anatómicos de los órganos genitales femeninos y al efectuar esta maniobra, cause la perforación. Esto es tan peligroso, que muchas mujeres se han causado la muerte.

Las manifestaciones de la infección, son generales y locales.

Generales: dolor, fiebre, escalofrío.

Locales: varían según su localización y extensión y se pueden clasificar en Endometritis, Salpingitis, Tromboflebitis, etc.

Estas infecciones mencionadas son consecuencia de las prácticas llevadas a cabo en el aborto séptico. A continuación mencionaré algunas de las