

debida a los trombos. La Tromboflebitis se desarrolla debido a que el sitio de implantación placentaria, es una masa de venas trombosadas y porque los estreptococos anaerobios que forman parte de la flora vaginal, a menudo se desarrollan en el medio anaerobio proporcionado por los trombos venosos.

HAY DOS GRUPOS DE VENAS QUE SE AFECTAN DE MODO PREFERENTE

I.—VENAS DE LA PARED UTERINA Y DEL LIGAMENTO ANCHO.
(venas ováricas, uterinas e hipogástricas).

II.—LAS VENAS DE LA PIERNA,
(Femoral poplítea y safena).

La inflamación de las piernas es una tromboflebitis pélvica; la inflamación de las segundas es una tromboflebitis femoral, mas solo haré mención de las primeras (tromboflebitis pélvica) que son las de primordial importancia en este caso.

TROMBOFLEBITIS PELVICA.— Se caracteriza por escalofríos intensos, tendencia a propagación a distancia (pulmones) hay ascensos súbitos de temperatura de 35.5 a 40 grados. En las complicaciones pulmonares se encuentran Neumonía, abscesos y pleuresia. El segundo lugar que resulta afectado es el riñón izquierdo; la vena más frecuentemente implicada en la tromboflebitis pélvica, es la ovárica, ya que ella drena parte superior del útero, que incluye a menudo, las venas del sitio de implantación de la placenta. EL PROCESO ES GENERALMENTE UNILATERAL.

La extensión del proceso hacia la vena ovárica izquierda:- Puede alcanzar su unión con la vena renal, implicando a éste con: abscesos renales.

Si resulta afectada la vena ovárica:- La trombosis se extiende hacia la vena cava inferior. A medida que la inflamación progresa, la trombosis se extiende hacia arriba, como mecanismo de defensa, para impedir una amplia diseminación de los microorganismos infectantes.

La trombosis de la vena infectada, puede limitar el avance de una infección, y el trombo, experimentar un proceso de organización. Los sitios secundarios más frecuentes en tromboflebitis pélvica: válvulas cardiacas pulmonares y riñones.

* COMPLICACIONES DE ABORTO SEPTICO.

Las complicaciones graves del aborto son: Hemorragia e infección. Debidas a perforaciones y lesiones uterinas por instrumentos rústicos y también falta de asepsia.

* INFECCION.— La infección que se da en el aborto se atribuyen la más de las veces a microorganismos especialmente a Escherichia Coli ae-