

Breve Historia de la Fiebre Tifoidea

HISTORIA.—La fiebre tifoidea se confundió, durante siglos, con otras fiebres continuas. Huxman distinguió la fiebre “Pútrida maligna” (tifus) de la “nerviosa lenta” (tifoidea). El distinguido clínico francés Louis descubrió en 1889 la enfermedad y la llamó fiebre Typhoide. Gerard, discípulo de Louis, en 1837 diferenció el tifus y la fiebre tifoidea después de observar epidemias de ambas enfermedades ocurridas simultáneamente en Filadelfia. En 1837, Budd escribió una monografía sobre la fiebre tifoidea y comprobó el mecanismo de la transmisión. En 1880 Eberth descubrió *Bacillus Typhosus* en los tejidos. Cuatro años más tarde Gaffky logró un cultivo puro. Chantemesse, en 1880 estudió la vacunación contra la tifoidea. En 1884, Wright, Pfeiffer y Kolle iniciaron la vacunación, pero pasó más de un siglo antes que se comprobara el valor profiláctico de la vacuna. En 1895 Widal descubrió la aglutinación sanguínea; en 1890 demostró el valor de la vacuna preventiva, que empleó en el ejército de Estados Unidos.

ESTADÍSTICAS

Estadísticas de la mortalidad por fiebre tifoidea en Sonora.