

siones brónquicas están situadas alrededor de un bronquiolo-intralobulillar, el cual está alterado lateralmente hasta -- aparecer obstruido por el pus. Las lesiones peribronquiales-- están formadas por los llamados nódulos de Charcot cuya descripción es la siguiente:

1.- En el centro aparece un bronquiolo con la mucosa infiltrada en su luz por polinucleares y un poco de fibrina y los vasos congestionados.

2.- Una zona media compuesta de alveolos de paredes congestionadas cuya cavidad esta obliterada por un exudado de - células epiteliales descamadas, con una cantidad de fibrina- menor que en la neumonía lobar, siendo en éstos exudados y - en el de los bronquiolos en el que los colorantes apropiados (método de Gram), demuestran la presencia de los gérmenes mencionados en la etiología; una zona periférica en la que los- alveólos con sus vasos dilatados comienzan a presentar en su luz un comienzo de descamación epitelial.

Sinonimia de la bronconeumonía.- Pulmonía, pulmonía do-  
ble, hervor de pecho.

Etiología.- La bronconeumonía es producida por una variedad de gérmenes: Neumococo, estafilococo, Hemophilus influenzae, neumobacilo de Fiedlander, proteus, Klebsiella pneumoniae, escherichias, bacilo de Koch, bacilo diftérico, hongos y virus.

Causas predisponentes.- Todas las bronconeumonías son --- realmente secundarias a procesos respiratorios sencillos, como rinofaringitis, laringitis, traqueítis. Entre otras causas mayores está la desnutrición, debido a que en nuestro medio es -- tan común; inhalación de gases, algunos anestésicos, acciden-- tes de deglución que llevan diversas partículas extrañas al ár-- bol brónquico y como complicación de otros padecimientos infe-- ciosos, sarampión, tosferina, difteria, meningitis, prematurez, partos prolongados, ruptura de membranas prematuras, partos -- atendidos por empíricas, falta de higiene ambiental, los cam-- bios de estación sobre todo en el invierno y a principio de la-- primavera.

Para reafirmar lo anterior expongo a continuación un por-- centaje de las causas predisponentes a bronconeumonía registra-- das en lactantes que se internaron en el Hospital Infantil de Mé-- xico de enero a diciembre de 1966.