

C Ó N C L U S I O N E S

La apendicitis aguda como ya dijimos anteriormente es la inflamación del apéndice vermiforme, la cual es producida principalmente por el E. Coli, siendo la obstrucción intraluminal el factor predisponente en este proceso. Se presenta más frecuentemente en varones en edad de 15 a 25 años, aunque también puede presentarse en cualquier edad y sexo.

Su tratamiento por elección es la apendicectomía salvo raras -- excepciones. Su recuperación cuando no hay complicaciones es -- total, la estancia intrahospitalaria suele ser de 4 a 5 días.

La mortalidad por apendicectomía es mínima, no así la morbilidad la cual es de un 40% aproximadamente siendo la causa principal de la misma, las infecciones producidas en la insición de la herida quirúrgica.

La falta de comunicación interpersonal entre el equipo de salud más específicamente entre el personal médico y el de enfermería así como la falta de información veraz y oportuna al paciente -- y familia sobre su padecimiento, tratamiento y evolución del -- mismo crean temor, ansiedad, inseguridad y desconfianza en el -- paciente y familia hacia el medio ambiente hospitalario, más -- específicamente hacia la enfermera, repercutiendo seriamente en la recuperación del paciente, alargando su estancia intrahospitalaria y lesionando la economía del paciente; como lo pudimos constatar en el estudio de caso presentado, ya que este paciente fue tratado inicialmente tomando en cuenta unicamente sus -- problemas físicos sin tomar en cuenta el área psicológica, ni -- la social; lo cual le ocasiono una serie de problemas psicológicos que repercutieron sobre los físicos alargando su etapa de -- recuperación.