

SINTOMATOLOGIA

Los principales síntomas son los siguientes:

DOLOR.— Se puede iniciar en el epigastrio las primeras horas para después localizarse en la fosa iliaca derecha siendo esta región donde se sitúa, mas también puede hacerlo en el mesogastria, en la región lumbar y aún en otras zonas distantes como la fosa iliaca izquierda, aunque de manera excepcional.

La forma generalmente es pungitiva sin embargo, en algunas ocasiones puede adoptar la de cólicos, la aparición la mayoría de las veces es gradual, mas esto no impide que en algunos casos sea brusca; la intensidad es variable, pudiendo ser desde muy suave en los casos subagudos, hasta intolerable en los casos sobreagudos, estado que obliga a los enfermos a guardar cama y adoptar posturas especiales para mitigarlo.

Durante las primeras 24 a 48 horas del padecimiento, el dolor se encuentra localizado, pero posteriormente puede extenderse la mayor parte de las veces a todo el abdomen traduciendo con ello la generalización del proceso infeccioso peritoneal.

En los casos de situación apendicular retrocólica el dolor se irradia a la región lumbar y en otras todavía más contadas hacia el miembro inferior derecho.

NAUSEAS Y VOMITOS.— Acompañando el dolor hacen su aparición las náuseas que fácilmente se convierten en vómitos en un principio pueden ser alimenticios, posteriormente biliosos y por último de contenido intestinal.

No en todos los casos se presentan dichos síntomas y en algunos se provoca con mucho esfuerzo.

31

FIEBRE.— Se presenta en un porcentaje alto de enfermos, síntoma que alcanza cifras de 38, 39 y aún hasta de 40 grados centígrados, que adopta diferentes tipos de curva, como remitente o intermitente, siendo a veces precedida de escalofríos.

CONSTIPACION.— El enfermo generalmente es constipado, no obstante puede defecar pastoso o diarreico.

El estado general del paciente revela un estado doloroso, existe disnea, oliguria y fenómenos infecciosos generales.

De todos estos síntomas el dolor parece ser el más constante y más útil para el diagnóstico y requiere un estudio cuidadoso.