

CAPITULO III

EXAMEN DE LA PERSONALIDAD DE LA PROSTITUTA.

I.—ASPECTO BIOLOGICO.— Con respecto al factor biológico, la teoría que atribuye la prostitución al temperamento apasionado de algunas mujeres parece ser exagerada. Las mismas prostitutas dan esta razón muy excepcionalmente. Por otra parte, algunos hombres de ciencia creen que la mayoría de las prostitutas sufren de atrofia de sus sensaciones sexuales, y que esto las capacita para llevar una vida sexual anormal. (Esta segunda teoría yerva en la dirección opuesta. Biológicamente, son mujeres de sexo enteramente normal y es simplemente la rutina profesional lo que embota su capacidad sensorial, aunque parecen recobrarla cuando conocen a algún hombre a quién realmente creen amar.

Paralelamente a la degeneración moral, las prostitutas han sido tildadas de degeneración física. Ciertamente es que las de más baja categoría son menos lindas y que físicamente son hasta inferiores a la mujer respetable de tipo medio, pero su método de vida no contribuye precisamente a que puedan conservar su lozanía y su figura. Los médicos especializados en la materia han descubierto en el examen de las mujeres de la calle síntomas que parecen indicar la degeneración física. Las anomalías en el cráneo, los dientes, los miembros inferiores, etc. Son puntos a favor de esta teoría. El doctor George Paul Boncour, profesor de criminología del Instituto Antropológico de París, ha llegado a la misma conclusión. Ha encontrado dos degeneraciones, la física y la morfológica.

No cabe duda de que la gran mayoría de las prostitutas menores de edad quienes se examinaron evidenciaron una inferioridad biológica asociada a menudo también a la inferioridad morfológica: Cara tosca, articulaciones macizas, nalgas, brazos y pantorrillas grandes, piernas cortas, manos largas hipertriosis; senos colgantes, etc. Y esto se encuentra en muchachas menores de dieciocho años, que con pocas excepciones, deben aún desarrollar las características de la adolescencia. No se cree que estos sean síntomas de degeneración, pero son síntomas indiscutibles de inferioridad bio-antropológica.

Las anomalías físicas, tan frecuentes en las prostitutas, se deben principalmente a la herencia, pues las estadísticas parecen probar que un gran porcentaje de ellas son descendientes de padres sífilíticos o alcohólicos.

Por cuanto hace a las investigaciones endocrinológicas, parece ser que hay algunas causas endocrinas que pueden inclinar a la mujer a dedicarse a la prostitución.

A).—El hipertiroidismo como un desencadenante del uranismo.

B).— El Síndrome adreno-genital o sea una hiperfunción de la corteza suprarrenal por exceso de andrógeno.

No se ha encontrado algún factor que condicionado genéticamente, de lu.

gar a que una mujer observe la conducta definida como prostitución congénita esto quiere decir que ninguna mujer al nacer tiene características somáticas o Psicológicas que la hagan caracterizarse como futura prostituta. Al respecto tenemos el pensamiento de Polly Adler, cuando dice: "Ninguna mujer nace prostituta y cualquier mujer puede llegar a serlo".

✓2.— ASPECTO PSICOLOGICO.— "Las prostitutas tienen de ordinario leves anormalidades mentales y psíquicas (inestabilidad, falta patológica de emotividad, irritabilidad, nerviosidad excesiva, etc.) y que muchas de ellas adolecen de falta de maurez psicosexual, lo cual se debe a menudo a una interrupción del desarrollo causada por frustraciones sufridas en la primera infancia".

Ciertamente, el hecho de que una mujer se dedique a la prostitución es un claro índice de su anormalidad, puesto que trata de resolver sus problemas internos y externos en forma totalmente inadecuada. Por tanto el porcentaje de prostitutas que podrían considerarse normales desde el punto de vista mental es muy bajo. Aunque afirmar lo que es "Anormalidades o perturbaciones Psíquicas" es complicado, ya que las desviaciones pequeñísimas acusadas en la conducta Psicológica, no suelen llamarse así, ya que esta denominación corresponde a cuadros bastante acentuados en la desviación de la conducta Psicológica.

Los conceptos Psicoanalíticos señalan que uno de los factores que originan el deseo de auto destrucción de la meretriz es el no haber recibido en la infancia suficiente afecto, o haber estado sometida a una sobreestimación sexual ya sea por haber contemplado actividades promiscuas, o haber sufrido tempranamente algún tipo de seducción sexual o haber sufrido una exagerada prohibición de la sexualidad.— (8)

Según Clover "La prostitución está ligada a la falta o deficiencia de un objeto amoroso".

La prostitución no es sexual porque la relación con el compañero ocasional es muy breve y distante, además a ella no le importa con quién está realizando el coito, pues ella piensa "No soy yo la que está participando en ésta relación, yo no siento nada, yo solo estoy ganando dinero sin importarme quién es mi compañero.

(8) Problemas de Psicopatología. ANORMALIDADES DEL CARACTER.
José A. de Laburu S.J.— Tercera Edición Editorial Mosca Hnos.— Pág. 23.

ASPECTO MEDICO.— Uno de los principales argumentos de los reglamentaristas para solicitar el control de la prostitución consistió en tratar de impedir la propagación de las enfermedades venéreas. La idea de que la prostitución era el principal factor de difusión de dichas enfermedades se arraigó desde la más lejanas épocas y cobró mayor vigor durante el siglo pasado y los primeros años del actual. Los más distinguidos estudiosos de la materia están de acuerdo en que la prostitución es fuente de las enfermedades venéreas pero no es definitiva, ni la única, pues también la promiscuidad aporta una cantidad muy alta de padecimientos de esa clase.

Se ha expresado que en las épocas más antiguas eran casi desconocidas las enfermedades venéreas. Sabemos, empero que Hipócrates había prohibido a las mujeres con Leusorrea el tener relaciones sexuales y Galeno había señalado el carácter inundo de la secreción producto de la Blenorragia.

Se sabe que en los siglos XV y XVI las disposiciones sanitarias en los prostibulos comenzaron a generalizarse las visitas médicas, las prostitutas independientemente de actuar en burdeles o en forma libre.

Pero fué en el siglo XIX cuando floreció el reglamentarismo la idea de proponer la inscripción, el registro y el examen médico de las prostitutas se fundamentó en la necesidad de controlar debidamente las enfermedades venéreas.

El Código Sanitario y el Código Penal en su art. 10. Considera enfermedades venéreas: "La sífilis, la blenorragia, el chancroblando, el granuloma venéreo, y las que declare el Departamento de Salubridad Pública.

La prostitución no es ya el principal factor de propagación de las enfermedades venéreas, pues en muchas ocasiones éstas se contagian por no meretrices.

En la actualidad exige una mayor libertad de las relaciones sexuales especialmente en los jóvenes debido a la divulgación de los diversos medios anticonceptivos, tienen con mayor frecuencia relaciones sexuales con amigos y compañeras y no con prostitutas.— (9)

La revisión médica no ofrece un medio seguro y por consiguiente brinda una protección poco eficaz.

Existen diversos tipos de enfermedades venéreas. Las dos más frecuentes son la Sífilis y la Blenorragia.

La Sífilis: Esta enfermedad es causada por una bacteria llamada la treponema pálida o la espiroqueta. Esta bacteria en forma de filamento se infiltra en la sangre y puede causar lesiones en todo el organismo, si no es des-

truida. La Sífilis puede transmitirse al feto durante el embarazo.

La Blenorragia: A menudo se llama a esta enfermedad gonorrea o también "Orina Caliente". La Blenorragia es de cinco a diez veces más frecuente que la Sífilis. Es causada por una bacteria: el Gonococo.

Para el individuo, el problema está casi resuelto, en tanto que vea a su médico: la Penicilina sigue siendo eficaz en la mayoría de los casos y cuando se produce una resistencia a este antibiótico, existen otros que pueden lograr la curación.