

E T I O L O G I A :

La Etiología de la preeclampsia y eclampsia no se conoce a pesar de los grandes esfuerzos de investigación. Campos importantes de sospechas en lo pasado han sido, - trastornos metabólicos de las proteínas, bloqueo de la actividad o metabolismo normal por la placenta en desarrollo, y deficiencias nutricionales (incluyendo proteínas, calorías, vitaminas y minerales). Se ha mencionado a la isquemia como causa básica de la Preeclampsia, pero aún se encuentra en investigación tal hipótesis.

F R E C U E N C I A : BENSON C. RALPH menciona que la frecuencia de las alteraciones hipertensivas del embarazo se presenta aproximadamente en un 15 % de las pacientes obstétricas que acuden en forma espontánea para control prenatal en consulta externa. Pero con mucha menor frecuencia (1-1.5 %) en pacientes vistas en la consulta privada.

Hay una mayor tasa de preeclampsia en primigestas si se compara con las multiparas, y un 65 % de los casos de preeclampsia y eclampsia ocurren durante el primer embarazo en mujeres menores de 17 años y mayor de 35 años. La preeclampsia y eclampsia ocupa unos de los primeros lugares de complicación del embarazo, en el hospital general del estado, con las características antes mencionadas.