

FACTORES DE RIESGO:

Sea cual sea la causa específica de la Preeclampsia y Eclampsia la experiencia clínica ha comprobado factores predisponentes manifiestos.

I) GENERALES: entre los más importantes se encuentran:

- a) RAZA.- Es más frecuente en las mujeres negras.
- b) EDAD.- Es más común en las mujeres menores de 20 años y en las edades avanzadas.
- c) PARIDAD.- Se presenta primordialmente en las primigestas, - cuando no se han pasado la tercera década de la vida, aumenta también en mujeres multigestas, - pero probablemente corresponda casos de Preeclampsia sobreañadida a otra patología.
- d) NIVEL SOCIOECONOMICO.- Es más frecuente en personas con - un poder adquisitivo bajo, dando como resultado - un deficit nutricional, tanto en calidad como en cantidad, principalmente en proteínas, riboflabina.

II) OBSTETRICOS:

- a) Molahidatidiforme.- Se presenta en un 3.3-% de los casos de ésta patología.
- b) Embarazo Gemelar.- Se complica en un 14 % y si es primigestas la cifra asciende a un 25%.
- c) Polohidramnios.
- d) Macrosomía fetal.

Todos estos estados, después del cuarto mes distienden el útero - de manera que dificulta el riesgo sanguíneo al producto, lo cual establecerá el cuadro de la patología.

III) .- PATOLOGIAS MATERNAS NO INHERENTES AL EMBARAZO.-

- a) La Obesidad.
- b) Hipertensión esencial.
- c) Las nefropatias.