

**DETECCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS PULMONAR
Y PARTICIPACION DEL PERSONAL DE ENFERMERIA
EN EL CENTRO DE SALUD.**

IMPORTANCIA:- Este punto es muy importante para tratar de evitar la propagación de la enfermedad en el seno familiar, cuando se ha detectado algún caso, ya sea en comunidad, en la consulta externa o intrahospitalariamente.

Intervienen en la detección de casos, la enfermera(ero) sanitaria, enfermera(ero) general y el estudiante de enfermería, que están en contacto directo con los pacientes y personas sanas en las instituciones de salud, en los barrios o comunidades donde las causas económicas, sociales y culturales son desfavorables, así como también el médico en la consulta, interrogando al paciente sobre síntomas que sugieren la enfermedad.

Estos profesionistas y estudiantes conocen que todo individuo que sufre tos y expectoración con más de 20 días de evolución son sospechosos de tuberculosis, es cuando se les debe de poner interés para tratarlos e invitarlos a que acudan a la consulta médica ya sea en el centro de salud, en el I.M.S.S. o el I.S.S.S.T.E., para corroborar el diagnóstico.

Con excepción de las épocas de epidemia de padecimientos respiratorios, se estima que del 3% al 5% de la población de 16 y más años de edad, sufre tos y expectoración de más de 20 días de duración.

Entre estos sintomáticos crónicos del aparato respiratorio, se calcula que la prudencia de "casos Bacilíferos de tuberculosis" es del orden del 4 al 6%.

Estos datos y el hecho de que en tuberculosis, la fuente de infección son los pacientes que eliminan gran cantidad de bacilos, por lo que puedan descubrirse por el examen del esputo (B.A.A.R.), justifican la pesquisa de sintomáticos crónicos del aparato respiratorio.