

Enrojecimiento y calor que no vuelven al color normal al aplicar masaje, esto nos indica que la naturaleza entró en acción y puso en circulación mayor sangre arterial para nutrir y revivir los tejidos dañados, y mandó leucocitos para impedir mayores daños y transportar las células muertas o incapacitadas. En éste período los tejidos están congestionados pero aún vivos y tienen buenas probabilidades de recuperarse si se tiene un buen cuidado de ellos y es favorable el estado general de paciente, -- también hay mayor sensibilidad y por lo general el paciente se queja de escozor; a menos que se tomen medidas especiales en este momento para atenuar la presión y aumentar la nutrición local de los tejidos, aparecerá una grieta en la piel del paciente. A continuación la escara aumentará en profundidad y el tejido se va descamando progresivamente

CLASIFICACION Y PROGRESO DE LAS ULCERAS POR DECUBITO.

Se ha trabajado intensamente para aclarar la patología de la úlcera por decúbito. Hay dos tipos principales: La forma benigna superficial y la forma maligna profunda.

La úlcera superficial comienza en la superficie cutánea con maceración de la piel desvitalizada y progresan hasta penetrar en las capas profundas.

Las úlceras profundas no se originan en la piel; son consideradas resultado de un proceso que comienza en los tejidos profundos y se extiende a la superficie.