

DISTRIBUCION

* El Micropterus salmoides es un pez característico de la ictiofauna de Norteamérica cuya distribución natural abarca desde la región Oriental de las Montañas Rocallosas al través de la Cuenca de los Grandes Lagos y el Valle del Mississippi, hasta Carolina del Norte hacia La Florida y desde el Sur de Canadá hasta el Noreste de México (Sigler y Miller, 1963).

Dicha distribución ha sido notablemente alterada, pues el hombre ha tomado papel importante en la distribución artificial de éste organismo, introduciéndolo de acuerdo a los datos de Mc. Dowall (1968) a los siguientes países: Africa del Sur, Alemania, Australia, Cameroun, Cuba, Checoslovaquia, España, Filipinas, Finlandia, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Japón, Madagascar, Natal, Rusia y Suecia.

En nuestro país, Arredondo (1973) menciona que se han efectuado introducciones en: Laguna de Abascochi y La Boquilla, Chihuahua; Laguna de Montebello, Chiapas; Endo, Hidalgo; Laguna de Chapala, Jalisco; Laguna de Zirahuén y Lago de Pátzcuaro, Michoacán; Laguna de Tequesquitengo y el Rodeo, Morelos; Laguna de Tacámbaro, Edo. de México; Valtequillo, Puebla; Sanalona y la Presa El Fuerte, Sinaloa; Laguna del Chaimel, Tamaulipas y en Catemaco y la Huasteca, Veracruz.

Además en la Colección de Peces, Laboratorio de Ictiología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, se cuenta con ejemplares procedentes de varias cuencas del país donde no existía ésta especie originalmente, como las del Río Nazas, Durango; Río Soto la Marina, Tamaulipas y Río Aguilaveal, Zacatecas.