

CLASIFICACIÓN  
Y  
TIPOS DE CÁNCER  
GÁSTRICO

## CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE CÁNCER GÁSTRICO

### ADENOCARCIONOMA CAPILAR SIMPLE :

Que invade en forma de una pequeña zona elevada secundaria o la proliferación de las criptas gástricas, se caracteriza por su imitación perfecta de un túbulo gástrico, los cuales son en forma irregular y atraviesan las submucosa, se hacen mas prominentes los bordes y puede presentar una ligera depresión del centro. Después si se produce la vascularización suele producirse necrosis y ulceración. El tumor adquiere a veces tamaño y un aspecto vegetante parecido a una coliflor.

### CARCINOMA COLOIDE O GELATINOSO :

Se caracteriza por el predominio de las células mucíparas que se infiltran rápidamente en la capa muscular y produce metástasis en los ganglios regionales y en el hígado.

### CARCINOMA MEDULAR:

Es una neoplasia con gran riqueza celular y escaso tejido conjuntivo, el tejido muestra alveolos pequeños o grandes o bien una multiplicación difusa de células atípicas.

La neoplasia puede ser de tamaño pequeño y localizarse en la submucosa, es común que se produzca una úlcera la cual presenta a menudo un engrosamiento notable en sus bordes.

#### ADENOCARCINOMA MEDULAR :

Puede tener carácter difuso o infiltrativo en lugar de circunscrito y ulceroso, puede haber invasión precoz de los ganglios linfáticos así como metástasis generalizada.

#### CARCINOMA ESCIRROSO :

Presenta dos formas circunscritas y difusa, la circunscrita puede ser similar a una úlcera benigna, si la destrucción superficial sigue el mismo ritmo de la neoplasia. Estos tumores muestran un exceso de tejido conjuntivo que generalmente rebasa los límites de la úlcera superficial e invaden linfáticos y los espacios intersticiales.

En la forma difusa las células epiteliales pueden desaparecer casi por completo.

El carcinoma escirroso tiene aspecto de una bota de cuero y a menudo produce una notable retracción del estómago, el cual se convierte en un órgano rígido y tubular con paredes gruesas y falta de flexibilidad.

MORFOLÓGICAMENTE SE EMPLEAN CLASIFICACIONES DONDE SE DIVIDE EL CARCINOMA GÁSTRICO EN 4 TIPOS.

Tipo I.-

Es el carcinoma polipoide el cual muestra atrofia de la mucosa alrededor de la formación tumoral.

Tipo II.-

Consiste en una lesión ulcerada, rodeada de un reborde elevado, la mucosa contigua se delimita claramente de la misma, el fondo de la úlcera muestra a veces restos necrosados de todos colores, pardo, púrpura gris, rojo oscuro o blanco.

Tipo III.-

Es el tipo infiltrante, esta úlcera tiene reborde que solo limita a un lado de la lesión y no termina bruscamente como el carcinoma II.

Tipo IV.-

Es la variedad infiltrante difusa, aquí no se encuentra por palpación o inspección límites claros en ninguna parte con la mucosa gástrica normal, a veces puede existir una infiltración en todo el estómago y pueden producirse ulceraciones en el fondo.